

## **2.2) PENTRU TRATAMENTUL PNEUMONIEI, BRONȘITEI CRONICE SIMPLE ȘI MUCOPURULENTE CU EXACERBARE**

### **(901) ACETYLCYSTEINUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală)

### **(911) CARBOCISTEINUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 375 mg (capsule);
2. 100 mg/5 ml (sirop);
3. 125 mg/5 ml - 200 ml (sirop);
4. 250 mg/5 ml - 120 ml (sirop);
5. 250 mg/5ml - 200 ml (sirop);
6. 50 mg/ml - 125 ml (sirop)

## **2.3) PENTRU TRATAMENTUL BRONȘITEI ACUTE, BRONȘITEI CRONICE SIMPLE ȘI MUCOPURULENTE CU EXACERBARE**

### **(901) ACETYLCYSTEINUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală)

### **(916) CEFPODOXIMUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate filmate);
2. 100 mg/5ml (pulbere suspensie orală)

### **(997) IBUPROFENUM (doar pentru tratamentul BRONȘITEI ACUTE)**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg/ml (pic. orale. sol);
8. 200 mg (capsule moi);
9. 200 mg (comprimate filmate);
10. 200 mg (drajeuri);
11. 400 mg (comprimate filmate);
12. 400 mg (capsule);
13. 400 mg (capsule moi);
14. 400 mg (drajeuri);
15. 400 mg/3 ml (soluție injectabilă);
16. 60 mg (supozitoare);
17. 125 mg (supozitoare)