

2.4) PENTRU TRATAMENTUL PANCREATITEI CRONICE, PANCREATITEI REACTIVE LA COPII

(037) PANCREATINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 000 UA (comprimate gastrorezistente);
2. 10 000 UA (capsule, capsule gastrorezistente);
3. 25 000 UI (capsule, capsule gastrorezistente; capsule moi gastrorezistente);
4. 300 mg (capsule, capsule gastrorezistente);
5. 150 mg (capsule, capsule gastrorezistente);
6. 5000 UI + 7000 UI + 400 UI (comprimate filmate gastrorezistente);
7. 275 mg (comprimate filmate gastrorezistente, comprimate gastrorezistente);
8. 250 mg (comprimate filmate gastrorezistente)

2.5) PENTRU TRATAMENTUL INFECTIEI CU CORONAVIRUS DE TIP NOU (COVID-19)*

*Notă: inclusiv medicamentele incluse în Secțiunea II, Capitol I conform schemei de tratament aprobate.

(901) ACETYLCYSTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală)

(227) AMBROXOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate, capsule);
2. 15 mg/5 ml – 60 ml (sirop);
3. 15 mg/5 ml – 100 ml (sirop, soluție orală);
4. 15 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 15 mg/5 ml - 150 ml (sirop);
6. 30 mg/5 ml – 100 ml (sirop);
7. 30 mg/5 ml - 150 ml (sirop);
8. 60 mg (comprimate eferv.)

(911) CARBOCISTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 375 mg (capsule);
2. 100 mg/5 ml (sirop);
3. 125 mg/5 ml – 200 ml (sirop);
4. 250 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 250 mg/5 ml – 200 ml (sirop);
6. 50 mg/ml - 125 ml (sirop)

(916) CEFPODOXIMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate filmate);
2. 100 mg/5 ml (pulbere suspensie orală)

(997) IBUPROFENUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg/ml (pic. orale.sol);
8. 200 mg (capsule moi);
9. 200 mg (comprimate filmate);